



ЗАМЕТКИ

***Andrusoviella* gen. n. (Ciliophora, Suctorea) — a New Substituting Name Instead *Andrusovia*: the Debugging of Possible Homonymy [*Andrusoviella* gen. n. (Ciliophora, Suctorea) — новое замещающее название для рода *Andrusovia*: устранение возможной омонимии].** — The new genus *Andrusovia* Dovgal, 2002 has been proposed for marine suctorians with stalked sacklike body, elliptical macronucleus and numerous capitate agile tentacles are distributed all over the cell body (Dovgal I. V. Evolution, phylogeny and classification of Suctorea (Ciliophora) // Protistology. — 2002. — 2, N 4. — P. 219). Type species of the genus was indicated as *Podophrya marina* Andrusova, 1886. However as has been found the name *Andrusovia* has already been preoccupied (Brusina in Westlund 1903) for the mollusc genus. For the reason of debugging of homonymy the new substituting name *Andrusoviella* Dovgal, gen. n. is proposed instead *Andrusovia* Dovgal, 2002 with the same type species and diagnosis. Generic name is given in honour of Dr. Yu. I. Andrusova, who is the author of the type species. — **I. V. Dovgal** (Schmalhausen Institute of Zoology of NAS of Ukraine, Kyiv).

Єнотовидний собака, *Nyctereutes procyonoides* (Mammalia, Canidae), у Закарпатті, Україна [Raccoon Dog, *Nyctereutes procyonoides* (Mammalia, Canidae), in the Transcarpathians, Ukraine]. — Єнотовидний собака, *Nyctereutes procyonoides* Gray, входить до складу теріофауни Карпат, характеризується незначною чисельністю і не має промислового значення (Турянин, 1975: 71–72). У 50-і роки ХХ ст. були невдалі спроби інтродукувати цей вид у різних місцях Українських Карпат, у т. ч. в Закарпатській обл., проте в Закарпатті до останнього часу його не реєстрували. Нещодавно представники цього виду почали з'являтися в окремих пунктах Східних Карпат, а в Угорщині та Чехословаччині відзначено істотне збільшення чисельності виду. Недавно з'явилася замітка про те, що кілька років тому єнотовидний собака був впольований місцевим жителем біля с. Гута Ужгородського р-ну та ще один дорослий самець — у жовтні 2005 р. біля с. Зміївка Березівського р-ну (Потіш, Башта // Вісник УжНУ. — 2005. — № 16. — С. 179). За нашими спостереженнями, цей вид тепер збільшує свою чисельність у Закарпатті й поширюється долинами великих і малих річок, вздовж каналів й стариць низовини і, можливо, по окремих великих міжгірських долинах Закарпатської обл. Одним із факторів, які зумовили зростання чисельності цих тварин за останні роки, могло стати більш вільне проникнення хижаків через прикордонні ділянки із суміжними країнами. На Закарпатті єнотовидний собака віддає перевагу місцевостям, де є заболочені ліси з чисельними водотоками. Окремі особини нами спостерігалися ще у травні 1988 р. біля р. Тиси, південніше м. Виноградів (тобто значно раніше згаданих знахідок). Потім, у лютому 1998 р. біля р. Боржави в ур. Великий Ліс, на північ від с. Квасове Березівського р-ну за слідами на снігу обліковано 4–6 особин. Приблизно в цій же місцевості, з іншого боку р. Боржави в ур. Оток, у лютому 2005 р. відзначено 4–5 особин. У березні цього ж року в ур. Рафайлів Ліс біля каналу Серне, що знаходиться на північ від с. Запсонь Березівського р-ну, зареєстровано ще 5–6 особин єнотовидного собаки. Поки що його не виявлено у долині р. Латориця, проте очевидно, що скоріше за все він з'явиться і тут внаслідок розселення. — **В. В. Боднар** (Ужгород).